

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia
(Dz. U. poz.)

TREŚĆ INFORMACJI

INFORMACJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA PREPARATU ZE STABILNYM JODEM

Po otrzymaniu preparatu ze stabilnym jodem zapoznaj się z niniejszą informacją oraz **ulotką dołączoną do opakowania preparatu przez wytwórcę produktu leczniczego. Ulotka zawiera najważniejsze informacje dotyczące dawkowania oraz działań niepożądanych.** Jeżeli informacje zawarte w ulotce są niezrozumiałe albo masz jeszcze inne pytania zgłoś się do swojego lekarza i porozmawiaj z nim na temat możliwości przyjęcia preparatu ze stabilnym jodem w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

UWAGA!

Preparat ze stabilnym jodem przyjmij wyłącznie na wyraźne wezwanie organów administracji państwowej udostępnione w środkach masowego przekazu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego skutkującego uwolnieniem substancji promieniotwórczych do środowiska.

Preparat ze stabilnym jodem dawkuj zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do produktu leczniczego.

Przyjęcie preparatu ze stabilnym jodem w krótkim czasie przed lub po uwolnieniu radioaktywnego jodu do środowiska chroni tarczycę, blokując ją przed wchłanianiem i kumulowaniem radioaktywnego jodu. Zastosowanie preparatów ze stabilnym jodem nie chroni organizmu osób narażonych na skażenie innymi pierwiastkami promieniotwórczymi niż radioaktywny jod.

Tabletki jodku potasu nie mogą odwrócić negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych przez jod radioaktywny, jeżeli wystąpiło już uszkodzenie tarczycy.

Jodek potasu nie zapewnia całkowitej ochrony organizmu przed skażeniem jodem radioaktywnym. Skuteczność blokowania tarczycy przed radioaktywnym jodem zależy od czasu przyjęcia preparatu ze stabilnym jodem oraz całkowitej ilości radioaktywnego jodu, na który organizm jest narażony.

Optymalny okres, w którym należy podać preparat ze stabilnym jodem wynosi mniej niż 24 godziny przed spodziewanym początkiem narażenia na promieniowanie i do dwóch godzin po nim. W razie braku możliwości podania preparatu ze stabilnym jodem w tym czasie, nadal zalecane jest podawanie tego preparatu w okresie do 8 godzin po początku narażenia na promieniowanie. Przyjęcie preparatów ze stabilnym jodem wcześniej lub później może nie przynieść oczekiwanego rezultatu lub spowodować negatywny skutek.

Zazwyczaj wystarczy jednokrotne przyjęcie odpowiedniej dawki preparatu ze stabilnym jodem.

W przypadku długotrwałego (powyżej 24 godzin) lub wielokrotnie powtarzającego się narażenia na promieniowanie lub nieuniknionego przyjęcia skażonej żywności czy wody, gdy jednocześnie ewakuacja nie jest możliwa, może być konieczne powtórne podanie dawki preparatów ze stabilnym jodem.

Nie jest zalecane podawanie powtórnej dawki preparatu ze stabilnym jodem noworodkom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią oraz osobom powyżej 60. roku życia. Osoby te powinny być ewakuowane z miejsca występowania promieniowania radiacyjnego w pierwszej kolejności.

Informacje dotyczące otrzymania lub wymiany opakowań preparatu ze stabilnym jodem przez osoby znajdujące się na terenie strefy planowania wyprzedzających działań interwencyjnych otrzymasz w:

..... Urządzie Wojewódzkim w

Wydział

tel., adres e-mail:, strona internetowa:

godziny pracy urzędu: