

**WSKAŹNIKI JAKOŚCI OPIEKI ONKOLOGICZNEJ WRAZ Z ICH WARTOŚCIĄ
DOCELOWĄ ORAZ MIERNIKAMI I FORMUŁĄ OBLICZENIA DLA
POSZCZEGÓLNYCH POZIOMÓW ZABEZPIECZENIA OPIEKI ONKOLOGICZNEJ
KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ SPECJALISTYCZNY OŚRODEK LECZENIA
ONKOLOGICZNEGO**

WSKAŹNIKI JAKOŚCI OPIEKI ONKOLOGICZNEJ		
I.	NIESPECYFICZNE	
1	Odsetek świadczeniobiorców, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, zwany dalej „WZT”, i sporządzono plan leczenia onkologicznego	
	Wartość docelowa	90%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców leczonych w danym Specjalistycznym Ośrodku Leczenia Onkologicznego, zwanym dalej „SOLO”, rozpoczynających leczenie onkologiczne, u których przed wykonaniem pierwszego świadczenia zdrowotnego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C00-C43, C45-C97, D00, D01, D02, D03, D05, D06, D07, D08, D09, D11.0, D14.0, D32, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D35.2, D35.4, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D75.2 lub D76.0 według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, zwanej dalej „ICD-10”, zgodnym z kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, zwaną dalej „kartą DiLO”, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego w danym SOLO zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C00-C43, C45-C97, D00, D01, D02, D03, D05, D06, D07, D08, D09, D11.0, D14.0, D32, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D35.2, D35.4, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D75.2 lub D76.0, zgodnym z kartą DiLO według ICD-10, u których rozpoczęto leczenie onkologiczne Nie dotyczy świadczeniobiorców, u których w karcie DiLO sprawozdano zabieg diagnostyczno-terapeutyczny
2	Odsetek wyników badań histopatologicznych lub cytologicznych prawidłowo sprawozdanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302, z późn. zm.), zwanego dalej „systemem P1”	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek badań histopatologicznych lub cytologicznych wykonanych w danym SOLO, które zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe w tym SOLO

	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba badań histopatologicznych lub cytologicznych wykonanych w danym SOLO, których wyniki prawidłowo sprawozdano i przekazano do systemu P1 Mianownik: Liczba badań świadczeniobiorców wykonanych w danym SOLO, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
3	Odsetek świadczeniobiorców, u których sprawozdano stan ogólny według Word Health Organization, Eastern Cooperative Oncology Group, zwanej dalej „ECOG”, w terminie pierwszego świadczenia z obszaru chemioterapii i innych metod leczenia lub radioterapii onkologicznej lub chirurgicznego leczenia zabiegowego	
	Wartość docelowa	90%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO rozpoczynających leczenie onkologiczne w jednym z trzech obszarów: leczenie zabiegowe chirurgiczne, chemioterapia i inne metody leczenia systemowego lub radioterapia onkologiczna, u których w terminie pierwszego świadczenia sprawozdano stan ogólny pacjenta według skali ECOG
	Formuła obliczenia	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C00-C43, C45-C97, D00, D01, D02, D03, D05, D06, D07, D08, D09, D11.0, D14.0, D32, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D35.2, D35.4, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D75.2 lub D76.0 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których odnotowano stan ogólny pacjenta według skali ECOG w terminie pierwszego sprawozdanego świadczenia chemioterapii, radioterapii onkologicznej lub chirurgicznego leczenia zabiegowego w danym SOLO Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C00-C43, C45-C97, D00, D01, D02, D03, D05, D06, D07, D08, D09, D11.0, D14.0, D32, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D35.2, D35.4, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D75.2 lub D76.0 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy rozpoczęli świadczenia w ramach chemioterapii lub radioterapii lub chirurgicznego leczenia zabiegowego
4	Odsetek świadczeniobiorców, u których rozpoczęto leczenie onkologiczne w terminie 14 dni od daty ustalenia planu leczenia onkologicznego przez WZT, lub u których wykonano zabieg diagnostyczno-leczniczy w terminie do 28 dni przed WZT	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, u których leczenie onkologiczne rozpoczęto nie później niż 14 dni po ustaleniu planu leczenia przez WZT, lub u których wykonano zabieg diagnostyczno-leczniczy w terminie do 28 dni przed WZT, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, dla których w danym SOLO zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C00-C43, C45-C97, D00, D01, D02, D03, D05, D06, D07, D08, D09, D11.0, D14.0, D32, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D35.2, D35.4, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D75.2 lub D76.0 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne w terminie do 14 dni od WZT,

		lub u których wykonano zabieg diagnostyczno-leczniczy w terminie do 28 dni przed WZT Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C00-C43, C45-C97, D00, D01, D02, D03, D05, D06, D07, D08, D09, D11.0, D14.0, D32, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D35.2, D35.4, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48, D75.2 lub D76.0 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
II. NARZĄDOWE – NOWOTWÓR PIERSI		
1	Kompletna diagnostyka przed WZT u świadczeniobiorców z nowotworem piersi	
	Wartość docelowa	95%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których w terminie 70 dni przed WZT wykonano: mammografię, badanie ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych oraz biopsję, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury medyczne według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych, zwanej dalej „ICD-9”: 87.372, 87.371, 88.732, 88.790, 85.113, 85.114, 85.131 lub 85.132, u których w terminie 70 dni przed WZT wykonano mammografię, badanie ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych oraz biopsję Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 87.372, 87.371, 88.732, 88.790, 85.113, 85.114, 85.131 lub 85.132, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
2	Kompletna diagnostyka wstępna i pogłębiona u świadczeniobiorców z nowotworem piersi	
	Wartość docelowa	95%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których w trakcie diagnostyki wykonano: mammografię, badanie ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych oraz biopsję, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, u których zakończono pełną diagnostykę wstępną i pogłębioną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne: 87.372, 87.371, 88.732, 88.790, 85.113, 85.114, 85.131 lub 85.132 według ICD-9, u których w trakcie diagnostyki (wstępnej lub wstępnej i pogłębionej wykonywanych u tego samego świadczeniodawcy) wykonano mammografię, badanie ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych oraz biopsję Mianownik:

		Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 87.372, 87.371, 88.732, 88.790, 85.113, 85.114, 85.131 lub 85.132, którzy zakończyli którzy zakończyli diagnostykę wstępną i pogłębioną z wyłączeniem: 1) diagnostyki wykonywanej na podstawie karty DiLO wydanej w ramach programów profilaktycznych; 2) diagnostyki, w której nie został zakończony etap diagnostyki pogłębionej.
3	Diagnostyka w stopniu zaawansowania klinicznego III u świadczeniobiorców z nowotworem piersi	
	Wartość docelowa	95%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, w stopniu zaawansowania klinicznego III, u których w terminie 70 dni przed WZT wykonano badania obrazowe: tomografię komputerową jamy brzusznej i miednicy oraz scyntyografię kości lub badanie pozytonowej tomografii emisyjnej, zwanej dalej „PET”, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców w stopniu zaawansowania III, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO w stopniu zaawansowania klinicznego III, z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.010, 88.011, 88.012, 92.14, 92.061 lub 92.062, u których w terminie 70 dni przed WZT wykonano tomografię komputerową jamy brzusznej i miednicy oraz scyntyografię kości (lub badanie PET) Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO w stopniu zaawansowania klinicznego III, z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.010, 88.011, 88.012, 92.14, 92.061 lub 92.062, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
4	Pogłębiona diagnostyka w stopniu zaawansowania klinicznego III u pacjentów z nowotworem piersi	
	Wartość docelowa	95%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi w stopniu zaawansowania klinicznego III leczonych w danym SOLO, u których w trakcie diagnostyki wykonano badania obrazowe: tomografię komputerową jamy brzusznej i miednicy oraz scyntyografię kości lub badanie PET, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców w stopniu zaawansowania klinicznego III, u których zakończono pełny etap diagnostyki pogłębionej
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO w stopniu zaawansowania klinicznego III, z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.010, 88.011, 88.012, 92.14, 92.061 lub 92.062, u których na etapie diagnostyki (pogłębionej lub wstępnej i pogłębionej wykonanych u tego samego świadczeniodawcy) wykonano tomografię komputerową jamy brzusznej i miednicy oraz scyntyografię kości (lub badanie PET) Mianownik:

		Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO w stopniu zaawansowania klinicznego III, z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.010, 88.011, 88.012, 92.14, 92.061 lub 92.062, u których zakończono etap diagnostyki pogłębionej
5	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, dla których został ustalony plan leczenia onkologicznego przez WZT i u których sprawozdano stopień zaawansowania nowotworu według międzynarodowej klasyfikacji TNM w terminie WZT	
	Wartość docelowa	95%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, dla których podczas WZT ustalono plan leczenia onkologicznego i jednocześnie sprawozdano stopień zaawansowania nowotworu według międzynarodowej klasyfikacji TNM, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których został ustalony plan leczenia onkologicznego przez WZT i u których sprawozdano stopień zaawansowania nowotworu TNM w terminie przeprowadzenia WZT Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie ICD-10: C50 lub D05, zgodnym z kartą DiLO, u których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
6	Radioterapia po leczeniu oszczędzającym u pacjentów z nowotworem piersi	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z inwazyjnym nowotworem piersi i cechą M0 leczonych w danym SOLO, u których po wykonaniu zabiegu oszczędzającego zastosowano radioterapię w wymaganym czasie do 180 dni od zabiegu, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których przeprowadzono operację oszczędzającą
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z inwazyjnym nowotworem piersi z cechą M0 (pierwsze sprawozdane M), z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 85.22, 85.26, 85.261, 92.247, 92.248, 92.246, 92.292, 92.291, 92.242, 92.31, 92.32, 92.241, 92.251, 92.413, 92.414, 92.452 lub 92.46, u których wykonano zabieg oszczędzający i którzy otrzymali radioterapię piersi po zabiegu - rozpoczęcie radioterapii do 180 dni po zabiegu Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z inwazyjnym nowotworem piersi i cechą M0 (pierwsze sprawozdane M), z rozpoznaniem o kodzie ICD-10: C50 lub D05, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 85.22, 85.26, 85.261, 92.247, 92.248, 92.246, 92.292, 92.291, 92.242, 92.31, 92.32, 92.241, 92.251, 92.413, 92.414, 92.452 lub 92.46, u których przeprowadzono operację oszczędzającą
7	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	

	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie : C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej
8	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni spośród świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, dla których zorganizowano WZT, i u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50, D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
9	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, u których wykonano diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębianej został zakończony w ciągu 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę pogłębianą
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej
10	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, u których wykonano z diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni spośród świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT	
	Wartość docelowa	50%

	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, dla których zorganizowano WZT i u których etap diagnostyki pogłębionej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego
11	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia	
	Wartość docelowa	90%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, u których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne Nie dotyczy świadczeniobiorców, u których sprawozdano zabieg diagnostyczno-terapeutyczny w karcie DiLO
12	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych za pośrednictwem systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem piersi leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne, których wyniki zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 Mianownik:

		Liczba świadczeniobiorców, leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C50 lub D05 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe
III.	NARZĄDOWE – NOWOTWÓR JELITA GRUBEGO	
1	Odsetek świadczeniobiorców, u których wykonano badania obrazowe w nowotworze jelita grubego przed leczeniem operacyjnym	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, u których przed leczeniem operacyjnym wykonano badania obrazowe: tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny jamy brzusznej lub miednicy oraz tomografię komputerową lub badanie rentgenowskie klatki piersiowej, w terminie do 104 dni przed leczeniem operacyjnym, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których przeprowadzono leczenie operacyjne
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne ICD-9: 88.010, 88.011, 88.012, 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 87.440, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.8, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 45.431, 45.52, 45.719, 45.721, 5.729, 45.731, 45.76, 45.799, 48.491, 48.691, 48.691 lub 48.692, u których wykonano tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny jamy brzusznej lub miednicy oraz tomografię komputerową lub badanie rentgenowskie klatki piersiowej w terminie do 104 dni przed leczeniem operacyjnym Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.010, 88.011, 88.012, 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 87.440, 87.410, 87.411, 87.412, 87.413, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.8, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 45.431, 45.52, 45.719, 45.721, 5.729, 45.731, 45.76, 45.799, 48.491, 48.691, 48.691 lub 48.692, u których przeprowadzono leczenie operacyjne
2	Odsetek świadczeniobiorców, u których wykonano rezonans magnetyczny miednicy w nowotworze odbytnicy przed leczeniem operacyjnym	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem odbytnicy leczonych w danym SOLO, u których przed leczeniem operacyjnym wykonano rezonans magnetyczny miednicy w terminie do 104 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których przeprowadzono leczenie operacyjne
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO rozpoznaniem o kodzie: C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.491, 48.691 lub 48.692, u których wykonano rezonans magnetyczny miednicy w terminie do 104 dni przed leczeniem operacyjnym Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury

		medyczne według ICD-9: 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.491, 48.691 lub 48.692, u których przeprowadzono leczenie operacyjne
3	Odsetek świadczeniobiorców z rozpoznaniem nowotworem jelita grubego, u których wykonano badanie molekularne	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, u których wykonano badanie molekularne w terminie do jednego roku przed WZT lub do jednego roku po WZT, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których w terminie do 1 roku przed WZT lub w terminie do 1 roku po WZT wykonano badanie molekularne: 1) podstawowe badanie genetyczne w chorobach nowotworowych lub 2) złożone badanie genetyczne w chorobach nowotworowych lub 3) zaawansowane badanie genetyczne w chorobach nowotworowych lub 4) kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nowotworowych Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
4	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego poddanych resekcji chirurgicznej, u których pooperacyjna ocena cechy N obejmowała ≥12 regionalnych węzłów chłonnych	
	Wartość docelowa	Dla rozpoznania ICD-10: C18, C19 - 80% Dla rozpoznania ICD-10: C20 - 60%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, którzy zostali poddani planowej resekcji chirurgicznej i u których w badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego oceniono co najmniej 12 regionalnych węzłów chłonnych, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców operowanych z powodu raka jelita grubego, z wyłączeniem świadczeniobiorców, którzy byli poddani radioterapii przedoperacyjnej w terminie 6 miesięcy przed zabiegiem
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.8, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 45.431, 45.52, 45.719, 45.721, 45.729, 45.731, 45.76, 45.799, 48.491, 48.691, 48.692, 92.246, 92.292, 92.291 lub 92.242, z oceną ≥12 węzłów chłonnych w materiale pooperacyjnym Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19, C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.8, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 45.431, 45.52, 45.719, 45.721, 45.729, 45.731, 45.76, 45.799, 48.491, 48.691, 48.692, 92.246, 92.292, 92.291 lub 92.242, którzy zostali poddani planowej operacji chirurgicznej z powodu nowotworu jelita grubego

		Nie dotyczy świadczeniobiorców z wykonaną radioterapią przedoperacyjną w terminie do 6 miesięcy przed zabiegiem
5	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego w stopniu zaawansowania klinicznego III, którzy otrzymali adjuwantową chemioterapię w terminie do 8 tygodni od leczenia operacyjnego	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego w stopniu zaawansowania klinicznego III leczonych w danym SOLO, którzy po leczeniu operacyjnym rozpoczęli adjuwantową chemioterapię w ciągu 8 tygodni od zabiegu, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców w stopniu zaawansowania III poddanych zabiegowi operacyjnemu
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z nowotworem jelita grubego w stopniu zaawansowania klinicznego III (TNM sprawozdany najbliżej daty WZT), z rozpoznaniem o kodzie: C18 lub C19 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.719, 45.721, 45.729, 45.731, 45.76 lub 45.799, którzy zostali poddani zabiegowi operacyjnemu i u których rozpoczęto adjuwantową chemioterapię w terminie do 8 tygodni od zabiegu Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z nowotworem jelita grubego w stopniu zaawansowania klinicznego III (TNM sprawozdany najbliżej daty WZT), z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedurami ICD-9: 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.719, 45.721, 45.729, 45.731, 45.76 lub 45.799, którzy zostali poddani zabiegowi operacyjnemu
6	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem odbytnicy w stopniu zaawansowania klinicznego II lub III, którzy otrzymali neoadjuwantową radioterapię lub radiochemioterapię przed leczeniem operacyjnym z tego powodu	
	Wartość docelowa	75%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem odbytnicy w klinicznym stopniu zaawansowania klinicznego II lub III leczonych w danym SOLO, u których przed leczeniem operacyjnym zastosowano neoadjuwantową radioterapię lub radiochemioterapię w terminie do 6 miesięcy przed zabiegiem, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców w stopniu zaawansowania klinicznego II lub III poddanych zabiegowi operacyjnemu z powodu raka odbytnicy
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C20 według ICD-10, w stopniu zaawansowania klinicznego II lub III, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 92.246, 92.292, 92.291, 92.242, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.41, 48.491, 48.691, 48.692 lub 49.92, u których zastosowano neoadjuwantową radioterapię lub radiochemioterapię w terminie do 6 miesięcy przed zabiegiem operacyjnym z tego powodu Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C20 według ICD-10, w stopniu zaawansowania klinicznego II lub III, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 92.246, 92.292, 92.291, 92.242, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.41, 48.491,

		48.691, 48.692 lub 49.92, którzy zostali poddani zabiegowi operacyjnemu z tego powodu
7	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, dla których został ustalony plan leczenia onkologicznego przez WZT i u których sprawozdano stopień zaawansowania TNM w dacie WZT	
	Wartość docelowa	90%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, dla których w ramach WZT ustalono plan leczenia onkologicznego i jednocześnie sprawozdano stopień zaawansowania TNM w terminie WZT, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których ustalono plan leczenia onkologicznego przez WZT i u których sprawozdano stopień zaawansowania TNM w terminie WZT Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19, C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
8	Odsetek zabiegów operacyjnych wykonanych metodą małoinwazyjną u świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego	
	Wartość docelowa	30%
	Miernik	Odsetek zabiegów operacyjnych wykonanych techniką małoinwazyjną (laparoskopową lub endoskopową) w danym SOLO u świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, w stosunku do wszystkich zabiegów operacyjnych przeprowadzonych z powodu tego rozpoznania
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba zabiegów małoinwazyjnych przeprowadzonych u świadczeniobiorców z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.8, 45.952, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 45.719, 45.721, 45.729, 45.731, 45.76, 45.799, 48.41, 48.491, 48.691, 48.692, 00.94 lub 54.21 Mianownik: Liczba zabiegów operacyjnych przeprowadzonych u świadczeniobiorców z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.8, 45.952, 48.5, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 45.719, 45.721, 45.729, 45.731, 45.76, 45.799, 48.41, 48.491, 48.691, 48.692, 00.94 lub 54.21
9	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, dla których wykonano z diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik:

		Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19, C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej
10	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni spośród świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, dla których zorganizowano WZT i u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT
11	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, u których wykonano diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębianej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę pogłębianą
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej
12	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, u których wykonano diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni spośród świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, dla których zorganizowano WZT i u których etap diagnostyki pogłębianej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100%

		Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie ICD-10: C18, C19 lub C20, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie ICD-10: C18, C19 lub C20, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT
13	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego	
	Wartość docelowa	90%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, u których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i ustalono plan leczenia onkologicznego Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne Nie dotyczy świadczeniobiorców, u których sprawozdano zabieg diagnostyczno-terapeutyczny w karcie DiLO.
14	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych za pośrednictwem systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jelita grubego leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne, których wyniki prawidłowo zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C18, C19 lub C20 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe
IV. NARZĄDOWE – NOWOTWÓR JAJNIKA		
1	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których wykonano badania obrazowe w celu oceny stopnia zaawansowania choroby	
	Wartość docelowa	85%

	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych w danym SOLO, u których w terminie do 30 dni przed WZT wykonano badania obrazowe: tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny jamy brzusznej lub miednicy oraz tomografię komputerową klatki piersiowej, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z rozpoznaniem raka jajnika, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 lub D39.9 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.010, 88.011, 88.012, 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 87.410, 87.411, 87.412 lub 87.413, u których w terminie do 30 dni przed WZT wykonano tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny jamy brzusznej lub miednicy oraz tomografię komputerową klatki piersiowej Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 lub D39.9 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.010, 88.011, 88.012, 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 87.410, 87.411, 87.412 lub 87.413, u których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
2	Odsetek świadczeniobiorców, u których wykonano zabieg diagnostyczno-leczniczy w terminie 21 dni spośród świadczeniobiorców skierowanych na zabieg diagnostyczno-leczniczy z powodu podejrzenia lub rozpoznania raka jajnika	
	Wartość docelowa	70%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z podejrzeniem lub rozpoznaniem raka jajnika leczonych w danym SOLO, u których zabieg diagnostyczno-leczniczy wykonano w terminie do 21 dni od zakończenia diagnostyki wstępnej, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców skierowanych na taki zabieg
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z nowotworem jajnika lub podejrzeniem raka jajnika, z rozpoznaniem o kodzie: C56 lub D39.9 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano zabieg diagnostyczno-leczniczy w terminie do 21 dni od terminu zakończenia diagnostyki wstępnej Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z nowotworem jajnika lub podejrzeniem raka jajnika, z rozpoznaniem o kodzie: C56 lub D39.9 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, których skierowano na zabieg diagnostyczno-leczniczy
3	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których wykonano badanie genetyczne	
	Wartość docelowa	75%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z nowotworem jajnika, u których po przeprowadzeniu WZT wykonano badanie genetyczne, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56, C57 lub C48 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których zorganizowano WZT i wykonano badanie genetyczne

		Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z nowotworem jajnika, z rozpoznaniem o kodzie: C56, C57 lub C48 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
4	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których po leczeniu operacyjnym rozpoczęto leczenie systemowe w terminie do 56 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych w danym SOLO, u których leczenie systemowe (chemioterapia lub terapia w ramach programu lekowego) rozpoczęto w terminie do 56 dni od leczenia operacyjnego, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których przeprowadzono leczenie operacyjne
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56, C57 lub C48 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 54.11, 54.21, 65.11, 65.12, 65.13, 65.14, 65.21, 65.22, 65.23, 65.24, 65.25, 65.26, 65.293, 65.31, 65.39, 65.41, 65.49, 65.519, 65.52, 65.53, 65.54, 65.61, 65.62, 65.63, 65.69, 66.4, 66.51, 66.521, 66.61, 68.41, 68.42, 68.51, 68.59, 68.61, 68.62 lub 68.71, u których w terminie do 56 dni po operacji rozpoczęto leczenie systemowe (chemioterapię lub leczenie w ramach programu lekowego) Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56, C57 lub C48 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 54.11, 54.21, 65.11, 65.12, 65.13, 65.14, 65.21, 65.22, 65.23, 65.24, 65.25, 65.26, 65.293, 65.31, 65.39, 65.41, 65.49, 65.519, 65.52, 65.53, 65.54, 65.61, 65.62, 65.63, 65.69, 66.4, 66.51, 66.521, 66.61, 68.41, 68.42, 68.51, 68.59, 68.61, 68.62 lub 68.71, u których przeprowadzono leczenie operacyjne
5	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej
6	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni spośród świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT	
	Wartość docelowa	50%

	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych w danym SOLO, dla których zorganizowano WZT i u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT
7	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego	
	Wartość docelowa	90%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych w danym SOLO, u których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego (w tym zabiegiem diagnostyczno-lecznym) zorganizowano WZT, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne, uwzględniając zabieg diagnostyczno-leczniczy
8	Odsetek badań świadczeniobiorców z nowotworem jajnik, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych za pośrednictwem systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek badań świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne, których wyniki zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 Mianownik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C56 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe
V. NARZĄDOWE – NOWOTWÓR GRUCZOŁU KROKOWEGO		

1	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, u których wykonano rezonans magnetyczny przed biopsją	
	Wartość docelowa	75%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których wykonano rezonans magnetyczny miednicy w terminie do 90 dni przed biopsją, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których przeprowadzono biopsję gruczołu krokowego
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 60.111, 60.112, 60.113, 60.12 lub 60.91, u których wykonano rezonans magnetyczny miednicy w terminie do 90 dni przed biopsją Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 88.95, 88.971, 88.976, 88.979, 60.111, 60.112, 60.113, 60.12 lub 60.91, u których przeprowadzono biopsję
2	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego ze stopniem zaawansowania pT3/pT4 spośród świadczeniobiorców poddanych zabiegowi operacyjnemu	
	Wartość docelowa	< 25%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których po leczeniu operacyjnym stwierdzono zaawansowanie patologiczne pT3 lub pT4, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których przeprowadzono leczenie operacyjne
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 60.51, 60.52, 60.53, 60.54, 60.55, 60.31, 60.42, 60.624 lub 60.32, ze stopniem zaawansowania pT3/pT4, u których przeprowadzono leczenie operacyjne Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 60.51, 60.52, 60.53, 60.54, 60.55, 60.31, 60.42, 60.624 lub 60.32, u których przeprowadzono leczenie operacyjne
3	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego z dodatnim marginesem operacyjnym (resekcja R1 lub R2) spośród świadczeniobiorców poddanych zabiegowi operacyjnemu	
	Wartość docelowa	<20%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których po radykalnej prostatektomii stwierdzono dodatni margines chirurgiczny (R1 lub R2), w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których wykonano radykalną prostatektomię
	Formuła obliczania	$\text{wartość} = \text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury

		medyczne według ICD-9: 60.51, 60.52, 60.53, 60.54 lub 60.55, u których przeprowadzono radykalną prostatektomię i w badaniu pooperacyjnym stwierdzono dodatni margines chirurgiczny (R1 lub R2) Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 60.51, 60.52, 60.53, 60.54 lub 60.55, u których przeprowadzono radykalną prostatektomię
4	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, którzy zostali poddani radykalnej prostatektomii i otrzymali dodatkowo leczenie radykalne z wykorzystaniem radioterapii w terminie do 180 dni po zabiegu chirurgicznym	
	Wartość docelowa	< 15%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których po radykalnej prostatektomii wdrożono leczenie radykalne z wykorzystaniem radioterapii w terminie do 180 dni od zabiegu, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których wykonano radykalną prostatektomię
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 60.51, 60.52, 60.53, 60.54 lub 60.55, poddanych radykalnej prostatektomii, którzy otrzymali leczenie radykalne z wykorzystaniem radioterapii onkologicznej w terminie do 180 dni po zabiegu chirurgicznym Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 60.51, 60.52, 60.53, 60.54 lub 60.55, poddanych radykalnej prostatektomii Nie dotyczy świadczeniobiorców poddanych procedurze brachyterapii i teleradioterapii
5	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne stosowane w inkontynencji, określone kodem Y.06.01, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 stawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 907), zwane dalej „Y.06.01”, przez okres minimum 6 miesięcy w terminie do 12 miesięcy od zabiegu prostatektomii laparoskopowej lub robotycznej	
	Wartość docelowa	< 15%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO poddanych prostatektomii laparoskopowej lub robotycznej, realizujących zlecenia na wyroby medyczne z grupy Y.06.01 przez co najmniej 6 miesięcy w terminie 12 miesięcy od zabiegu, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, u których wykonano prostatektomię laparoskopową lub robotyczną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano zabieg prostatektomii laparoskopowej lub robotycznej, realizujących zlecenia na wyroby

		medyczne z grupy Y 06.01 przez okres minimum 6 miesięcy w terminie 365 dni od terminu zabiegu Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano zabieg prostatektomii laparoskopowej lub robotycznej
6	Odsetek świadczeniobiorców z rozpoznaniem nowotworu gruczołu krokowego poddanych aktywnej obserwacji	
	Wartość docelowa	20%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z rozpoznaniem nowotworu gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, którzy zostali zakwalifikowani do aktywnej obserwacji, tj. nie otrzymali leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii, terapii w programach lekowych ani farmakoterapii przeciwnowotworowej, w terminie 365 dni od rozpoznania, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano w terminie 60 dni biopsję gruczołu krokowego, poddanych aktywnej obserwacji, którzy nie otrzymali leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii, terapii w programach lekowych ani farmakoterapii przeciwnowotworowej w terminie 365 dni od rozpoznania, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, sprawozdanych w terminie 60 dni po biopsji gruczołu krokowego Dotyczy świadczeniobiorców, którzy nie mieli prowadzonego leczenia z powodu nowotworu gruczołu krokowego do 183 dni przed datą pierwszej wizyty z danym rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10
7	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej
8	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni spośród świadczeniobiorców, którzy mieli przeprowadzone WZT	
	Wartość docelowa	50%

	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10 dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
9	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, u których wykonano diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębianej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę pogłębianą
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej
10	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, u których wykonano diagnostykę pogłębianą w terminie do 21 dni spośród świadczeniobiorców, którzy mieli zorganizowane WZT	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego i u których etap diagnostyki pogłębianej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = $\text{licznik} \div \text{mianownik} \times 100\%$ Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębianej w terminie do 21 dni i dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego Mianownik:

		Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
11	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego	
	Wartość docelowa	90%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, u których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy przed rozpoczęciem leczeniem onkologicznym mieli zorganizowane WZT i dla których sporządzono plan leczenia onkologicznego Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne Nie dotyczy świadczeniobiorców, którzy w karcie DILO mają wpisany zabieg diagnostyczno-terapeutyczny
12	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych do systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem gruczołu krokowego leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne i których wyniki prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1 Mianownik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C61 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe
VI. NARZĄDOWE – NOWOTWÓR PŁUCA		
1	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, u których wykonano procedury diagnostyczne przed rozpoczęciem leczenia	
	Wartość docelowa	70%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, u których przed rozpoczęciem pierwszego leczenia wykonano procedury diagnostyczne umożliwiające ustalenie rozpoznania cytologicznego lub histopatologicznego w terminie do 60 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100%

		Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których sprawozdano procedury medyczne według ICD-9: 33.21, 33.22, 33.231, 33.232, 33.239, 33.24, 33.25, 33.26, 33.271, 33.272, 33.273, 33.28 lub 40.10 wykonane w terminie do 60 dni przed rozpoczęciem leczenia Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których przeprowadzono pierwsze leczenie Nie dotyczy świadczeniobiorcy, który był leczony z powodu nowotworu płuca w terminie do 183 dni przed datą pierwszej wizyty z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO
2	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca w stopniu zaawansowania IB lub wyższym, u których przeprowadzono badanie molekularne	
	Wartość docelowa	65% (wskaźnik uwzględnia wykonywanie badania molekularnego w przypadku raka gruczołowego i wielkokomórkowego)
	Miernik	Odsetek nowych świadczeniobiorców z nowotworem płuca w stopniu zaawansowania IB lub wyższym leczonych w danym SOLO, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne i u których wykonano badanie molekularne w terminie do 90 dni przed WZT, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem i stopniem zaawansowania, którzy rozpoczęli leczenie
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, w stopniu zaawansowania IB lub wyższym, którzy rozpoczęli leczenie i u których przeprowadzono badanie molekularne w terminie do 90 dni przed WZT Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, w stopniu zaawansowania IB lub wyższym, którzy rozpoczęli leczenie z tego powodu Nie dotyczy świadczeniobiorcy, który był poddany leczeniu powodu nowotworu płuca w terminie do 183 dni przed datą pierwszej wizyty z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO
3	Odsetek świadczeniobiorców z rozpoznaniem nowotworem płuca, u których przed rozpoczęciem leczenia operacyjnego, radiochemioterapii lub radioterapii radykalnej wykonano badanie PET-TK	
	Wartość docelowa	85%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, u których wykonano badanie PET-TK w terminie do 60 dni przed rozpoczęciem leczenia operacyjnego, radiochemioterapii lub radioterapii radykalnej, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, którzy rozpoczęli jedno z tych form leczenia
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których w terminie do 60 dni przed zabiegiem operacyjnym, radiochemioterapią lub radioterapią radykalną wykonano badanie PET-TK

		Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których przeprowadzono pierwsze leczenie operacyjne lub radiochemioterapię lub radioterapię radykalną
4	Odsetek chorych na nowotwór płuca operowanych radykalnie z dodatnim marginesem chirurgicznym (R1 lub R2)	
	Wartość docelowa	<8%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, u których po radykalnym leczeniu operacyjnym (lobektomii, segmentektomii, pneumonektomii lub wycięciu klinowym) stwierdzono dodatni margines chirurgiczny (R1 lub R2) w badaniu histopatologicznym, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców poddanych radykalnemu leczeniu operacyjnemu
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których przeprowadzono radykalne leczenie operacyjne (lobektomia, segmentektomia, pneumonektomia, wycięcie klinowe) z dodatnim marginesem chirurgicznym (R1 lub R2) w histopatologicznym badaniu pooperacyjnym Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których przeprowadzono radykalne leczenie operacyjne (lobektomia, segmentektomia, pneumonektomia, wycięcie klinowe)
5	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę wstępną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej w terminie do 28 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki wstępnej
6	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, u których wykonano diagnostykę wstępną w terminie do 28 dni spośród świadczeniobiorców, którzy mieli zorganizowane WZT	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, dla których zorganizowano WZT i u których etap diagnostyki wstępnej został zakończony w terminie do 28 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki

		wstępnej w terminie do 28 dni, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
7	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, u których wykonano diagnostykę pogłębioną w terminie do 21 dni	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębionej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców, u których zakończono diagnostykę pogłębioną
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej
8	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, u których wykonano diagnostykę pogłębioną w terminie do 21 dni spośród świadczeniobiorców, dla których zorganizowano WZT	
	Wartość docelowa	50%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, u których etap diagnostyki pogłębionej został zakończony w terminie do 21 dni, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy zakończyli etap diagnostyki pogłębionej w terminie do 21 dni Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego
9	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego	
	Wartość docelowa	90%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z tym rozpoznaniem, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100%

		Licznik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, dla których przed rozpoczęciem leczenia onkologicznym zorganizowano WZT i sporządzono plan leczenia onkologicznego Mianownik: Liczba świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, którzy rozpoczęli leczenie onkologiczne Nie dotyczy świadczeniobiorców z zabiegiem diagnostyczno-terapeutycznym odnotowanym w karcie DiLO
10	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca, dla których sprawozdano wyniki badań histopatologicznych lub cytologicznych do systemu P1	
	Wartość docelowa	80%
	Miernik	Odsetek świadczeniobiorców z nowotworem płuca leczonych w danym SOLO, dla których wykonane badania histopatologiczne lub cytologiczne zostały prawidłowo sprawozdane i przekazane do systemu P1, w stosunku do wszystkich badań, dla których sprawozdano procedury zabiegowe
	Formuła obliczania	wartość = licznik ÷ mianownik x 100% Licznik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których wykonano badania histopatologiczne lub cytologiczne, których wyniki prawidłowo sprawozdano i przekazano do systemu P1 Mianownik: Liczba badań świadczeniobiorców leczonych w danym SOLO, z rozpoznaniem o kodzie: C34 według ICD-10, zgodnym z kartą DiLO, u których sprawozdano procedury zabiegowe