

**SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DLA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH DOTYCZĄCE
POZOSTAŁOŚCI SUBSTANCJI CZYNNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN**

Lp.	Środek spożywczy	Szczegółne wymagania dotyczące pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin
1	Grejpfruty (pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	karbendazim i benomyl (suma benomylu i karbendazimu wyrażona jako karbendazim) – najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości: 0,01 mg/kg
2	Pomarańcze (pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
3	Cytryny (cedrat, cytryna)	
4	Limy (limonki)	
5	Mandarynki (klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	
6	Jabłka (jabłoń płonka)	
7	Gruszka (gruszka azjatycka)	
8	Pigwa	
9	Nieszpułka zwyczajna	
10	Nieśplik japoński	
11	Morela	
12	Czereśnia (wiśnie i czereśnie (czereśnia pospolita, wiśnia pospolita))	
13	Brzoskwinie (nektaryny i podobne mieszańce)	
14	Śliwki (śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita / daktyl chiński / jujuba pospolita (<i>Ziziphus zizyphus</i>))	
15	Winogrono stołowe	
16	Winogrono do produkcji wina	
17	Mango	

18	Papaja	
19	Pomidory (pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), <i>Physalis spp.</i> / miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (<i>Lycium barbarum</i> i <i>Lycium chinense</i>), pomidor drzewiasty)	
20	Bakłazan (oberżyna) (psianka melonowa (pepino), antroewa / bakłazan biały (<i>Solanum macrocarpon</i>))	
21	Fasola (w strąkach) (fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, wspięga chińska (<i>Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis</i>), nasiona guar, ziarna soi)	
22	Groch (w strąkach) (groszek śnieżny, groszek cukrowy)	
23	Brukselka, kapusta brukselska	
24	Grzyby uprawne	
25	Jęczmień	
26	Miód i pozostałe produkty pszczele	
27	Inne owoce ziarnkowe	
28	Papaja	glufosynat (suma izomerów glufosynatu, jego soli i jego metabolitów: kwasu 3-[hydroksy (metylo)-fosfinylo]propionowego (MPP) i N-acetylo-glufosynatu (NAG), wyrażona jako glufosynat) – najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości: 0,01 mg/kg
29	Pomidory (pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty, miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (<i>Lycium barbarum</i> i <i>Lycium chinense</i>))	
30	Bakłazan (oberżyna) (psianka melonowa (pepino), antroewa / bakłazan biały (<i>Solanum macrocarpon</i>))	
31	Ketmia jadalna (okra)	
32	Brukselka	
33	Fasola w strąkach	
34	Groch w strąkach	
35	Pieczarka (grzyby uprawne (pieczarka dwuzarodnikowa, bocznik	

	ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)))	
36	Jęczmień	
37	Owies	
38	Żyto	
39	Pszenica (orkisz, pszenżyto)	
40	Ziemniak	
41	Grejpfruty (pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)	tiofanat metylowy – najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości: 0,01 mg/kg
42	Pomarańcze (pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)	
43	Cytryny (cedrat, cytryna)	
44	Limy (limonki)	
45	Mandarynki (klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce)	
46	Jabłka (jabłoń płonka)	
47	Gruszka (gruszka azjatycka)	
48	Pigwa	
49	Nieszpułka zwyczajna	
50	Nieśplik japoński	
51	Morela	
52	Czereśnie (wiśnie i czereśnie (czereśnia pospolita, wiśnia pospolita))	
53	Brzoskwinie (nektaryny i podobne mieszańce)	
54	Śliwki (śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita / daktyl chiński / jujuba pospolita (<i>Ziziphus zizyphus</i>))	
55	Winogrona do produkcji wina	
56	Mango	
57	Papaja	
58	Pomidory (pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), pomidor drzewiasty,	

	miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (<i>Lycium barbarum</i> i <i>Lycium chinense</i>))	
59	Bakłażan (oberżyna) (psianka melonowa (pepino), antroewa / bakłażan biały (<i>Solanum macrocarpon</i>))	
60	Ketmia jadalna (okra)	
61	Melony (ogórek kiwano (melon rogowaty))	
62	Dynie (dynia olbrzymia (późna odmiana))	
63	Arbuz	
64	Brukselka	
65	Jęczmień	
66	Owies	
67	Żyto	
68	Pszenica (Orkisz, pszenżyto)	
69	Inne owoce ziarnkowe	
70	Algi i organizmy prokariotyczne	